## SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

## STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

(AVEYRON. AUDR. GARD. HÉRAULT. LOZÉRE. PYRÉNÉES-ORIENTALES)

MONTPELLIER - 16, Rue de la République - Tél. 72 58-72

5ème année nº 7

Edition Générale nº 2

7 Mars 1957

INFORMATIONS

MONILIA de l'ABRICOTIER

Zones I, 2, 3

Par suite des pluies du 6 mars et dès la chute des pétales,

refaire un traitement des abricotiers avec :

- sels de cuivre (à faible dose de cuivre métal)

- soufres micronisés (surtout dans les vergers atteints par l'oïdium et la rouille)

- un anticryptogamique de synthèse (T.M.T.D., Zinèbe, Zirame, Captane).

Renouveler ce traitement en cas de nouvelles pluies.

TAVELUKE du POIRIER

Toutes zones


Le traitement conseillé par le bulletin nº 4 doit être renouvelé.

ANTHONOME du POMMIER

Toutes zones







Depuis quelques jours l'anthonome est observé dans plusieurs vergers des Cévennes. Le stade de vulnérabilité du pommier se situe de C à D.

Sur poirier où des piqures nutricielles sont observées, l'anthonome peut également provoquer de graves dommages.



C'est pourquoi nous conseillons un traitement à :

- 1'H.C.H. (et dérivés)
- au Lindane
- au D.D.T.

Dans les vergers où de nombreux "clous de girofle" ont été observés en 1956 (Montagne Noire en particulier) ce traitement sera renouvelé après une semaine.

TEIGNE du CERISIER

Toutes zones

D'après nos observations en laboratoire à partir d'échantillons provenant des valléss du Jaur et de l'Orb, on peut craindre de très importants dégâts de ce parasite. Dès que les bourgeons blanchissent (stade ci-contre) effectuer une pulvérisation d'H.C.H, ou de Lindane.

L'Inspecteur,

Le Contrôleur,

P.BERVILLÉ L.L.TROUILLON
Imprimé à la Station d'Avertis Agric. du Languedoc-Roussillon
16 rue de la République-Montpellier. Le Gérant : TROUILLON Aut.

du 6/3/56. Reproduction, adaptation réservées.

-3-57 **1**486

7168